

Border®

ERBICIDA SELETTIVO DI POST-EMERGENZA PER IL MAIS

Composizione

MESOTRIONE puro g 9,3 (=100 g/L)

Formulazione

sospensione concentrata

Registrazione N. 15965 del 17/09/2015

Classificazione CLP

ATTENZIONE



Confezioni

BARATTOLO DA 1KG
(10x1)

Consigli d'impiego: Border® si impiega in post-emergenza della coltura, nello stadio compreso fra le 2 e le 8 foglie. In presenza di infestanti graminacee impiegare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle malerbe (2-3 foglie).

Su infestanti dicotiledoni, Border® va applicato quando le malerbe hanno raggiunto lo stadio di 2-4 foglie.

Utilizzare la dose maggiore per il controllo di malerbe ben sviluppate.

Per evitare possibili danni alla coltura, non miscelare il prodotto con insetticidi carbammati e fosfororganici. L'eventuale applicazione di questi insetticidi dovrebbe essere distanziato di almeno 4 settimane dall'applicazione di Border®. Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme. Evitare sovrapposizioni di prodotto.

Prevenzione e gestione della resistenza: Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima HPPD (Gruppo F2 della classificazione HRAC). Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Campi d'applicazione, dosi e modalità d'impiego

COLTURA	INFESTANTI SENSIBILI	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Mais	<p>INFESTANTI SENSIBILI <i>Abutilon theophrasti</i> (Cencio molle), <i>Amaranthus spp.</i> (Amaranto), <i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa del pastore), <i>Chenopodium album</i> (Farinaccio), <i>Galium aparine</i> (Attacamani), <i>Polygonum lapathifolium</i> (Poligono a forma di romice), <i>Polygonum persicaria</i> (Persicaria comune), <i>Polygonum convolvulus</i> (Fallopia convolvolo), <i>Raphanus raphanistrum</i> (Ramolaccio selvatico), <i>Solanum nigrum</i> (Erba morella), <i>Stellaria media</i> (Stellaria), <i>Viola spp.</i> (Viola), <i>Xanthium spp.</i> (Lappola), <i>Bidens tripartita</i> (Forbicina), <i>Sinapis arvensis</i> (Senape selvatica)</p> <p>INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI <i>Digitaria sanguinalis</i> (Sanguinella), <i>Echinochloa crus-galli</i> (Giovone), <i>Galinsoga parviflora</i> (Galinsoga), <i>Polygonum aviculare</i> (Correggiola).</p>	0,5-1,5 l/ha	<p>Border® si impiega in post-emergenza della coltura, nello stadio compreso fra le 2 e le 8 foglie</p> <p>In presenza di infestanti graminacee impiegare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle malerbe (2-3 foglie) alla dose di 1,5 l/ha.</p> <p>Su infestanti dicotiledoni, BORDER® va applicato quando le malerbe hanno raggiunto lo stadio di 2-4 foglie, alla dose di 0,5-1,0 l/ha. Utilizzare la dose maggiore per il controllo di malerbe ben sviluppate.</p>	Non richiesto