

Cyren® 44 EC

INSETTICIDA DOTATO DI ENERGETICA AZIONE PER CONTATTO,
PER INGESTIONE E PER INALAZIONE

Composizione

CLORPIRIFOS puro g 44,3 (=480 g/l)

Formulazione

Concentrato emulsionabile

Registrazione N° 9153 del 07/03/1997

Classificazione CLP

PERICOLO



Confezioni

BOTTIGLIA DA 1L
(12x1)

TANICA DA 10L
(2x10)

Consigli d'impiego: Cyren® 44 EC si impiega alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.

Compatibilità: Il Cyren® 44 EC non è miscelabile con il polisolfuro di calcio e di bario.

Prevenzione e gestione della resistenza: Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza e' consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione.

Fitotossicità: Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile. Su albicocco, si consiglia di eseguire dei saggi varietali prima del trattamento. Su colture floreali ed ornamentali effettuare dei saggi preliminari per accertare la selettività del prodotto sulle varietà e nelle diverse condizioni ambientali.

Campi d'applicazione, dosi e modalità d'impiego

COLTURA	SPECIE PARASSITA	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Mandarino	Cocciniglie	110 ml/hl (1,65 l/ha)	Trattare la parte aerea alla presenza dei parassiti. Max 2 trattamenti per anno	30 giorni
	Aleurodidi (<i>Dialeurodes citri</i> , <i>Aleurotrixus floccosus</i>)			
	Formiche	220 ml/hl		
Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone, Nashi	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>), Tortricidi ricamatori, Sesidi, Cocciniglie, <i>Cacopsylla melanoneura</i> , <i>Cacopsylla picta</i> Rodilegno giallo e rosso, Afide lanigero	110 ml/hl (1,65 l/ha)	Max 1 trattamento per anno	Trattamenti fino alla fase di frutticino appena formato
Vite da vino, Vite da tavola	Tignole, Cicaline, <i>Metcalfa pruinosa</i> , Cocciniglie	110 ml/hl (vite vino 1,5 l/ha, vite tavola 1,35 l/ha)	2 tratt/anno vite vino, 1 tratt/anno vite tavola	30 gg vite vino, fino a pre-fioritura vite tavola
Pesco, Nettarina, Albicocco	<i>Cydia molesta</i> , <i>Anarsia lineatella</i> , Cocciniglie	110 ml/hl (1,65 l/ha)	Max 1 trattamento per anno	Fino a pre-fioritura
Barbabietola da zucchero	Nottue, Altiche, Atomaria, Cleono, Nottue del terreno (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>)	1 l/ha	Max 1 trattamento per anno	60 giorni
Mais e Mais dolce	Piralide, Sesamia, Diabrotica, Nottue del terreno (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>)	1-1,5 l/ha	Max 1 trattamento per anno	60 giorni

COLTURA	SPECIE PARASSITA	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro da industria, Peperone, Melanzana	Lepidotteri (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Ostrinia nubilalis</i>), Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Nottue del terreno (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>)	0,75 l/ha	Massimo 1 trattamento per anno	10 giorni per melanzana, pomodoro e peperone solo fino pre-fioritura
Cavoli a testa (Cavolo cappuccio, Cavolo di Bruxelles, Cavolo verza, Cime di rapa, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero) e a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo, Broccolo)	Lepidotteri (<i>Mamestra brassicae</i> , <i>Pieris brassicae</i> , <i>Pieris Rapae</i>), Nottue del terreno (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>)	1 l/ha	Massimo 1 trattamento per anno	21 giorni per i cavoli, per i cavoli a testa solo fino alla formazione del pomo
Colture floreali ed ornamentali (in pieno campo)	Tripidi, Tortricidi, Nottue, Cocciniglie, Oziorinchi, Aleurodidi, Nottue del terreno (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>)	100 ml/hl o 0,8 l/ha	Massimo 1 trattamento per anno	Non richiesto