

Composizione

ZETA- CIPERMETRINA g 1,65 (=15 g/l)

Formulazione

Concentrato emulsionabile

Registrazione N° 9747 del 16/09/1998

Classificazione CLP

ATTENZIONE



Confezioni

BOTTIGLIA DA 1L
(12x1)

Consigli d'impiego: Applicare Fury® ai primi attacchi dei parassiti in assenza di melata e con le foglie non accartocciate.

Eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità: In caso di miscela con altri formulati, accertarne preventivamente la compatibilità fisica preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

Prevenzione e gestione della resistenza: Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza è consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d'azione.

Fitotossicità: Non trattare sulle varietà di lattuga Gentile e Manita. Sono stati osservati, talora, in serra, importanti fenomeni di fitotossicità.

Campi d'applicazione, dosi e modalità d'impiego

COLTURA	SPECIE PARASSITA	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Arancio, Limone	Aleurodidi, Mosca mediterranea, Afidi	150-170 ml/hl	Intervenire alla comparsa dei parassiti, prima che questi penetrino nel vegetale o vengano protetti dagli accartocciamenti fogliari	14 giorni
Pesco	Afidi, Anarsia, Cidia molesta, Tripidi, Mosca della frutta	200-220 ml/hl		
Melo, Pero	Afidi, adulti di Minatori fogliari, larve di Ricamatrici, neanidi di Psilla	200-220 ml/hl		
Vite	Tignole, Cicaline, larve di Piralide	150-170 ml/hl		28
Cavolo cappuccio, Cavolfiore, Broccoli, Lattuga (escluse varietà Gentile e Manita), Indivia, Fagiolino	Afidi, Aleurodidi, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Piralidi	150-170 ml/hl		7 giorni
Cetriolo, Melone, Melanzana, Peperone	Afidi, Aleurodidi, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Piralidi	150-170 ml/hl		3 giorni

COLTURA	SPECIE PARASSITA	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Cicoria, Radicchio, Patata, Pomodoro	Afidi, Aleurodidi, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Piralidi	150-170 ml/h	Intervenire alla comparsa dei parassiti, prima che questi penetrino nel vegetale o vengano protetti dagli accortacciamenti fogliari	3 giorni
Mais	Piralide, Sesamia	2,5 lt/ha	Contro piralide al 50% pannocchie emesse	60 giorni
Barbabietola da zucchero	Altica, Cleono, Nottue fogliari, Nottue terricole	1,3-1,5 lt/ha	Nottue fogliari: 6-10 foglie; nottue terricole: 2-4 foglie	21 giorni
Fruento	Afidi del nanismo, Afidi della spiga	1 lt/ha	Afidi nanismo: autunno; afidi spiga: spigatura	35 giorni
Tabacco	Afidi, Altica, Nottue	150-170 ml/hl		Non richiesto
Floreali ed ornamentali	Afidi, Tripidi	150-170 ml/hl		Non richiesto