

Granstar® Olivo

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA DELLE INFESTANTI A FOGLIA LARGA DELL' OLIVO

Composizione

TRIBENURON METILE 50%

Formulazione

Granuli idrodispersibili

Registrazione N° 16281 del 18/05/2015

Classificazione CLP

ATTENZIONE



Confezioni

BARATTOLO CON DOSATORE DA 50 g (10x50)

Consigli d'impiego: Granstar® Olivo è l'innovativo prodotto per il diserbo dell'oliveto e la preparazione delle piazzole di raccolta. Granstar® Olivo coniuga tutte le caratteristiche ricercate in un diserbo per garantire sicurezza, efficacia e semplicità. Si consiglia l'impiego di Granstar® Olivo in miscela con altri prodotti al fine di completare lo spettro d'azione.

Compatibilità: Granstar® Olivo non è fisicamente compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.

Prevenzione e gestione della resistenza: Granstar® Olivo è un erbicida contenente tribenuron metile, una sostanza attiva appartenente alla famiglia chimica delle solfoniluree che agisce per inibizione dell'enzima aceto lattato sintetasi (ALS). Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di infestanti resistenti si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi differente meccanismo d'azione e nel contempo adottare idonee pratiche agronomiche e/o meccaniche.

Campi d'applicazione, dosi e modalità d'impiego

COLTURA	INFESTANTI SENSIBILI	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Olivo (solo su piante dopo il terzo anno dalla piantumazione)	Infestanti sensibili: Acetosella (<i>Oxalis spp.</i>), Borsa del pastore (<i>Capsella bursapastoris</i>), Calendula (<i>Calendula spp.</i>), Camomilla bastarda (<i>Anthemis arvensis</i>), Centocchio (<i>Stellaria media</i>), Farinello comune (<i>Chenopodium album</i>), Grespino dei campi (<i>Sonchus arvensis</i>), Grespino comune (<i>Sonchus oleraceus</i>), Ortica (<i>Urtica dioica</i>), Papavero (<i>Papaver rhoeas</i>), Senape (<i>Sinapis arvensis</i>), Infestanti mediamente sensibili: Attaccamani (<i>Galium aparine</i>), Cardo mariano (<i>Silybum marianum</i>), Centocchio dei campi (<i>Anagallis arvensis</i>), Erigero (<i>Conyza canadensis</i>), Falsa orica reniforme (<i>Lamium amplexicaule</i>), Geranio (<i>Geranium molle</i>).	da 25 a 40 g/ha	Applicare in post-emergenza delle infestanti a foglia larga in autunno o fine inverno-inizio primavera. Effettuare un solo trattamento per stagione	28 giorni