

# Mojang® TX

ERBICIDA DI PRE EMERGENZA E POST EMERGENZA PRECOCE PER IL MAIS

## Composizione

PETHOXAMIDE g 27,8 (=300 g/l)  
TERBUTILAZINA g 17,48 (=187,5 g/l)

## Formulazione

Suspoemulsione

Registrazione N° 16037 del 29/12/2016

## Classificazione CLP

ATTENZIONE



## Confezioni

TANICA DA 5L  
(4x5)

**Consigli d'impiego:** Il migliori risultati si ottengono se l'applicazione viene effettuata su terreno sufficientemente umido, in modo che l'erbicida possa essere efficacemente assorbito dalle radici delle infestanti.

La presenza di un letto di semina ben preparato contribuisce per una migliore efficacia del prodotto.

**Compatibilità:** Il prodotto è compatibile in miscela con prodotti a base di isossaflutolo e clomazone.

**Prevenzione e gestione della resistenza:** Allo scopo di evitare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare al prodotto erbicidi aventi un differente meccanismo d'azione e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

## Campi d'applicazione, dosi e modalità d'impiego

COLTURA	INFESTANTI SENSIBILI	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Mais	<b>Graminacee:</b> Giavone ( <i>Echinochloa crus galli</i> ) Setaria ( <i>Setaria spp.</i> ) Fienarola ( <i>Poa spp.</i> )  <b>Dicotiledoni:</b> Farinello ( <i>Chenopodium spp.</i> ) Amaranto ( <i>Amaranthus spp.</i> ) Galinsoga ( <i>Galinsoga parviflora</i> ) Geranio ( <i>Geranium spp.</i> ) Camomilla ( <i>Matricaria spp.</i> ) Mercorella ( <i>Mercurialis annua</i> ) Papavero ( <i>Papaver rhoeas</i> ) Piantaggine ( <i>Plantago major</i> ) Porcellana ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Rafano ( <i>Raphanus raphanistrum</i> ) Poligoni ( <i>Polygonum spp.</i> ) Erba morella ( <i>Solanum nigrum</i> ) Centocchio ( <i>Stellaria media</i> ) Forbicina comune ( <i>Bidens spp.</i> ) Stramonio ( <i>Datura stramonium</i> ) Sanguinella ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Crespino ( <i>Sonchus arvensis</i> )	Dose massima di 3 l/ha in pre-emergenza e di 3-4 l/ha in post-emergenza precoce	Impiegare in pre emergenza della coltura, o in post emergenza precoce (mais da 1 a 4 foglie), in 200-400 litri di acqua	Non richiesto