

Composizione

TRIFLUSULFURON METILE 50%

Formulazione

Granuli idrodispersibili (DF)

Registrazione N° 8886 del 19/06/1996

Classificazione CLP

ATTENZIONE



Confezioni

BARATTOLO CON DOSATORE DA 120 G (X 10)

Consigli d'impiego: Attivo nei confronti delle infestanti dicotiledoni, Safari® deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Aggiungere sempre olio bianco. Safari® non ha attività residuale e l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento. Safari® si impiega alla dose di 30-40 g/ha in miscela con altri principi attivi, oppure da solo. La coltura deve essere allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie. Si applica preferibilmente in due trattamenti distanziati di 7-14 gg tra di loro.

Compatibilità: Safari® è fisicamente compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero. Si sconsigliano miscele con formulati a reazione alcalina e con formulati contenenti ethofumesate e clopiralid.

Prevenzione e gestione della resistenza: Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare Safari® con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto che si verificano nel tempo.

Campi d'applicazione, dosi e modalità d'impiego

COLTURA	INFESTANTI SENSIBILI	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Barbabietola da zucchero e da foraggio	Infestanti sensibili: <i>Abutilon theophrasti</i> (Cencio molle), <i>Ammi majus</i> (Visnaga maggiore), <i>Amaranthus retroflexus</i> (Amaranto), <i>Galium aparine</i> (Attaccamani), <i>Polygonum aviculare</i> (Corregiola), <i>Polygonum persicaria</i> (Persicaria), <i>Sinapis alba</i> (Senape bianca), <i>Sinapis arvensis</i> (Senape selvatica), <i>Solanum nigrum</i> (Erba morella), <i>Sonchus arvensis</i> (Grespino), <i>Sonchus asper</i> (Grespino spinoso), <i>Veronica hederifolia</i> (Veronica a foglie d'edera).	30 - 40 g/ha	Utilizzare Safari® dallo stadio cotiledonare alle 6 foglie della barbabietola.	Non richiesto