

Spotlight Plus®

PRODOTTO AD AZIONE ERBICIDA, SPOLLONANTE E PER IL DISSECCAMENTO PRE RACCOLTA DELLA PATATA

Composizione

CARFENTRAZONE ETILE g 6,45 (=60 g/l)

Formulazione

Emulsione acqua/olio

Registrazione N° 13466 del 25/02/2010

Classificazione CLP

ATTENZIONE



Confezioni

BOTTIGLIA DA 1L
(12x1)

TANICA DA 5L
(4x5)

Consigli d'impiego: Spotlight Plus® agisce per contatto per cui la qualità dell'attività dissecante dipende dalla accuratezza con la quale viene realizzata l'applicazione del prodotto. Eseguire una adeguata ed uniforme distribuzione della miscela (300-500 L/ha di acqua), assicurandosi che la velocità di avanzamento del trattore e la pressione della pompa irroratrice permettano una elevata penetrazione del prodotto nella vegetazione. Usare esclusivamente ugelli antideriva.

Applicare il prodotto preferibilmente al mattino anche in presenza di vegetazione leggermente umida.

Sulla patata, per ottenere un'attività dissecante ottimale, evitare l'applicazione in condizioni climatiche estreme: siccità o umidità eccessiva, temperature elevate ed umidità dell'aria molto bassa. Non applicare il prodotto al calare del sole. Non applicare su colture colpite da forti attacchi di peronospora.

Compatibilità: Il prodotto è normalmente utilizzato in miscela con erbicidi totali, sistemici o di contatto che ne completano lo spettro d'azione.

Prevenzione e gestione della resistenza: Allo scopo di evitare la comparsa e la diffusione di infestanti resistenti, si consiglia di miscelare o alternare il prodotto con altri aventi un differente meccanismo d'azione.

Campi d'applicazione, dosi e modalità d'impiego

COLTURA	INFESTANTI SENSIBILI	Dosi	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite, Melo, Pero, Actinidia, Pesco, Susino, Agrumi, Nocciolo, Olivo	Applicato in miscela con glifosate ne integra e rende più rapida l'azione nei confronti di infestanti quali: Vilucchio (<i>Convolvulus arvensis</i>) Malva (<i>Malva sylvestris</i>) Porcellana (<i>Portulaca oleracea</i>)	0,3 l/ha	In miscela con erbicidi sistemici (glifosate)	7 giorni
Diserbo totale degli incolti (aree industriali e civili, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie)	Acetosella (<i>Oxalis spp.</i>) Plantaggine (<i>Plantago mayor</i>) Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>) Ortica (<i>Urtica dioica</i>) Coniza (<i>Conyza spp.</i>) allo stadio di rosetta			Non previsto
Vivai di piante arbustive e arboree				

COLTURA	INFESTANTI SENSIBILI	Dosi	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite, Melo, Pero, Actinidia, Pesco, Susino, Agrumi, Olivo	Azione spollonante per il controllo di germogli basali e del tronco	0,3 l/hl (0,9-1 l/ha)	Localizzare il trattamento sulla zona dei polloni utilizzando barre schermate per evitare che la deriva della soluzione raggiunga la vegetazione non interessata al trattamento. Utilizzare basse pressioni di esercizio (1-2 bar). I migliori risultati si ottengono trattando i polloni da eliminare quando presentano una lunghezza di 10-15 cm e non sono lignificati.	7 giorni
Nocciolo		0,35-0,4 l/hl (1 l/ha)		
Patata	Azione disseccante in pre raccolta	1 l/ha	Applicare il prodotto alla completa maturazione dei tuberi e ad inizio del processo di senescenza della coltura	3 giorni