

Starprop®

ERBICIDA SELETTIVO PER FRUMENTO TENERO, DURO E ORZO

Composizione

FENOXAPROP-P-ETHYL 6,7% (=69 g/l)
CLOQUINTOCET-MEXYL 3,35% (=34,5 g/l)
(antidoto agronomico)

Formulazione

Emulsione olio-acqua

Registrazione N° 12960 del 05/11/2008

Classificazione CLP

ATTENZIONE



Confezioni

BOTTIGLIA DA 1L
(12x1)

Consigli d'impiego: Il prodotto va applicato con volumi d'acqua di 200-400 l/ha.

Si consiglia di intervenire non oltre la fase di fine accestimento delle colture. Con elevata infestazione di avena e scagliola, impiegare sempre la dose massima di etichetta. Il prodotto non controlla il loietto (*Lolium spp.*).

Compatibilità: Starprop® è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonici normalmente applicabili in post-emergenza dei cereali quali le solfoniluree. Si sconsiglia la miscela estemporanea con ormonici, dicamba, bifenox e bentazone, in quanto sono possibili riduzioni di efficacia.

Prevenzione e gestione della resistenza: Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'ACCCase. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Campi d'applicazione, dosi e modalità d'impiego

COLTURA	INFESTANTI SENSIBILI	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Frumento tenero Frumento duro	Avena (<i>Avena spp.</i>) Scagliola (<i>Phalaris spp.</i>) Poa (<i>Poa spp.</i>) Apera (<i>Apera spica venti</i>) Coda di topo (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	1 - 1,2 l/ha	Post-emergenza della coltura (dallo stadio di 3 foglie fino a fine accestimento)	Non previsto
Orzo	Avena (<i>Avena spp.</i>) Falaride (<i>Phalaris spp.</i>) Poa (<i>Poa spp.</i>) Apera (<i>Apera spica venti</i>) Coda di topo (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	0,8 - 1 l/ha	Post-emergenza della coltura (entro lo stadio di fine accestimento)	