






















































































Epoche di trapianto e raccolta indicative per la Sardegna [aggiornato maggio 2026]

ROMANESCHI	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
Autunnali con ciclo medio precoce (80-100 GG)													
BENVENUTO F1 75-80 GG													
ETRUSCO F1 [HMC 33089] 85-90 GG													
PINETO F1 95-100 GG													
NAVONA F1 100-105 GG													
GITANO F1 100-110 GG													
Invernali con ciclo tardivo (130-200 GG)													
TULLIO F1 130-135 GG													
DECUMANO F1 135-140 GG													
LAZIO F1 140-145 GG													
ROSKOF F1 150-160 GG													
DOMITIO F1 160-170 GG													
COLOSSEO F1 180-190 GG													
POMEZIO F1 190-200 GG													
Gamma esclusiva - Romaneschi a pomo arancio													
AMO-125 F1 120-130 GG													
AMO-145 F1 140-150 GG													

Epoche di trapianto e raccolta indicative per la Sardegna [aggiornato maggio 2026]

VARIETÀ A POMO VERDE	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
Autunnali con ciclo medio precoce (80-100 GG)													
MALACHITE F1 80-85 GG					 	  	  	 					
FANGIO F1 85-90 GG						  	  	 					
EMERAUDE F1 90-95 GG						  	  	 					
TREVI F1 90-95 GG						  	  	 					
Invernali con ciclo tardivo (125-170 GG)													
NAZARIO F1 125-135 GG								  	  	  			
MAGNIFICO F1 130-140 GG								 	  	  	 		
GALILEO F1 160-170 GG									  	  	 		

Trapianto 

Raccolta 

Programma di coltivazione proposto in buona fede, derivato dalle osservazioni condotte sul territorio in condizioni ottimali.
Viene fornito a titolo indicativo ed è pertanto privo di qualunque garanzia di raccolto e/o vincolo contrattuale.